

G E S A M T I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
DATHE, H.H. - Der Gattungsname der Maskenbienen: <u>Hylaeus</u> versus <u>prosopis</u> (Apoidea, Colletidae)	147-154
DATHE, H.H. - Zum Vorkommen von <u>Hylaeus</u> F. - Arten im Gebirge nebst Festlegung von Lectotypen (<u>Hymenoptera</u> : <u>Apoidea</u> , <u>Colletidae</u>)	155-168
EBMER, A.W. - Ergänzungen zur Bienenfauna Iberiens. Die Gattungen <u>Halictus</u> , <u>Lasioglossum</u> und <u>Dufourea</u> (<u>Apoidea</u> , <u>Hymenoptera</u>)	117-146
GEITLER, L. - Die Conjugate <u>Mesotaenium</u> <u>dodekahedron</u> Geitler von einem zweiten Fundort ...	295-296
GRIMS, F. - Volkstümliche Pflanzen- und Tiernamen aus dem nordwestlichen Oberösterreich	33-65
GRIMS, F. - Ein Fundort von <u>Diphasium issleri</u> (ROUY) HCLUB im Kobernaußer-Wald, Oberösterreich	279-285
GUSENLEITNER, L. - Die <u>Microdynerus</u> - und <u>Pseudomi-</u> <u>crodynerus</u> -Arten des Balkans und der Türkei (<u>Eumenidae</u> , <u>Hym.</u>)	75-94
GUSENLEITNER, J. - Die Arten der Untergattung <u>Neoleptochilus</u> BLÜTHGEN, 1961, auf der Iberischen Halbinsel (<u>Eumenidae</u> , <u>Hym.</u>)	95-103
HÜBL, E. - Beziehungen der Flora Österreichs zur Flora der Balkanhalbinsel	287-294
KAPFER, G. - Sammelreise in die Abruzzen (Italien) ..	209-213
KUMP, A. - Ein Beitrag zur Verbreitung von <u>Geranium</u> <u>pratense</u> L.	105-115
LENZENWEGER, R. - Algologische Notizen I	215-217
LENZENWEGER, R. - Algologische Notizen II	227-235

LENZENWEGER, R. - Algologische Notizen III	267-270
LENZENWEGER, R. - Algologische Notizen IV	271-278
LONSING, A. - Stand der floristischen Kartierung in Oberösterreich Ende 1978	207-208
MELZER, H. - Neues zur Flora von Oberösterreich, Nie- derösterreich, Wien und dem Burgenland	169-192
MITTER, H. - Auswertung zweier Coleopterenausbeuten aus der Gegend von Hammamet (Tunesien)	237-243
SCHULTZE, E. - Pollenanalytische Untersuchung eines Seebohrkernes aus dem Profundal des Wörthersees (Westbecken) in Kärnten	1-19
SCHULTZE, E. - Die Bedeutung eines Pollenprofils aus dem Haidensee (486 m NN) in Kärnten für die spät- und frühpostglaziale Vegetationsentwicklung im nörd- lichen Klagenfurter Becken	21-31
SCHMIDT, R. - Klimaoszillationen der Älteren und Jün- geren Dryas (III) am Beispiel dreier Pollenprofile aus dem Salzkammergut (Egelsee/Attersee, Nussen- see, Moor von Rödschitz)	67-73
SPETA, F. - Zur Systematik und Karyologie von <u>Belle- valia hyacinthoides</u> (BERTOL.) K. PERSSON & WENDEL- BO (= <u>Strangweia spicata</u> BOISS., <u>Liliaceae</u> s.l.)..	245-266
TITZ, W. - Über die Abtrennung des karpatisch-ostsub- mediterranen Endemiten <u>Arabis hornungiana</u> von <u>A. hirsuta</u> s.str. (<u>Brassicaceae</u>)	219-226
WEINMEISTER, B. - Ein Bestimmungsschlüssel der euro- päischen Rosenarten in Anlehnung an die Flora Eu- ropaea	193-205